

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 11-10-77002548

## ÉDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

## SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3  
Tél. (78) 62.20.30 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F

C.C.P. LYON 9431-17  
Régisseur Avances et Recettes D. D. A.  
55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Bulletin N° 98

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région 10 Octobre 1977

### ARBRES FRUITIERS

#### DEPERISSEMENT BACTERIEN DU PECHER -

Dans les zones où la maladie est présente ou menaçante, les traitements d'automne constituent une précaution indispensable contre son extension.

Le cuivre reste le seul bactériostatique valable, utilisé à raison de 125 gr/hl de cuivre-métal (par exemple 500 gr/hl de sulfate de cuivre de la Bouillie Bordelaise ou 250 gr/hl de Viricuire 50).

Le programme de traitements comportera 4 traitements espacés de 10 à 15 jours suivant l'importance des précipitations. Ces applications devront couvrir la totalité de cette période dès son début.

#### CLOQUE ET CORYNEUM DU PECHER -

Dans les vergers où ces maladies ont sévi en 1977, appliquer deux traitements à 500 gr/hl de cuivre-métal pendant la chute des feuilles. Dans les vergers où les traitements contre la bactériose sont envisagés, ces applications tiendront lieu des 1er et 3e traitements contre la bactériose.

#### MALADIE BACTERIENNE DU POIRIER -

Dans les nombreux vergers atteints par cette maladie en 1977, appliquer vers la fin de la chute des feuilles une pulvérisation cuprique à raison de 250 gr/hl de cuivre-métal.

#### TAVELURES SUR POMMIER ET POIRIER -

Après les attaques souvent fortes de l'année écoulée, on réduira les risques de contaminations en 1978 par des traitements en fin de végétation :

- soit les jours précédant la chute des feuilles par une pulvérisation du feuillage à l'aide de Bénomyl (Benlate), Carbendazim (Bavistine) ou Méthylthiophanate (Pelt 44) à 50 gr/hl de matière active.

- soit au sol, après la chute des feuilles, de 1 000 l/ha d'une solution d'Urée pure à 5 kg/hl (soit 50 kg/ha).

### GRANDE CULTURE

#### GROSSE ALTISE DU COLZA -

Compte tenu des conditions climatiques favorables (températures de ces derniers jours relativement élevées) et des premiers résultats des piègeages, il est conseillé aux agriculteurs de surveiller attentivement les jeunes cultures de colza. Dès que la présence des insectes ou de leurs premiers dégâts sera constatée, il est conseillé d'effectuer un traitement insecticide dans les jours suivants.

Produits utilisables (dose/ha en pulvérisation)

Endosulfan 250 gr	Parathion 200 gr	ou Malathion 700 gr
Méthidathion 250 gr	Phosalone 1 000 gr	
Toxaphène et Polychlorocamphane	1 250 gr.	

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la Circonscription phytosanitaire Rhône-Alpes: R. GIREAU.

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes - Le Directeur-Gérant : P. JOURNET.

Inscription à la C.P.P.A.P. N° 477 AD.

7292